



きちんと予防してくれてるって感じ。
収穫7日前まで使えるのも助かるね。

茨城県結城郡八千代町 大里 賢一さん(57歳)



はくさいを手がけて37年になるベテランの大里賢一さん。以前は軟腐病が重点防除対象でしたが、5年前ごろから軟腐病に代わり、べと病の発生が問題となってきました。すでにねぎで効果を実感していた大里さんは、5年前からはくさいにアミスター20フロアブル(以下、アミスター20)を愛用していらっしゃいます。

「よく効くよ、アミスター20。茎べとの症状なんか全然出ないからさ。きちんと予防してくれてるって感じがするね」。

秋冬はくさいの9~10月あたりは病気発生のピーク。大里さんは、この時期、リドミルMZ水和剤(以下、リドミル)を1回、その2週間後に他剤を1回、さらに2週間あけてアミスター20の2000倍液を動噴で1回、散布していらっしゃいます。アミスター20は収穫7日前まで使えるから便利、と大里さん。

「たいていは収穫まで、リドミル、他剤、アミスター20の3回の散布でいけるんだ。でも、アミスター20を散布したあと、べと病の多発注意情報とかがファックスで入ると、収穫までもう1回防除しなきゃならない。そうするとアミスター20は収穫7日前まで使えるから、すごく助かるんだよね」。

アミスター20があると気分的にラクだね、と大里さん。そろそろ秋冬はくさいの準備が始まります。

 **アミスター[®]20**
フロアブル

syngenta[®]

シンジェンタ ジャパン株式会社

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階
<http://www.syngenta.co.jp>

農業をご使用の際は、ご購入先、または当社ウェブサイトなどで最新の登録内容をご確認ください。 ®はシンジェンタ社の登録商標 TMはシンジェンタ社の商標

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●薬剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●使用後の空容器、空袋等は圃場などに放置せず適切に処理してください。 ;

※2007年6月4日現在の情報です。

TM