

殺菌剤

名称:アミスターオプティフロアブル
種類:アゾキシストロビン・TPN水和剤

適用の範囲と使用方法

2017年04月12日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数		
きゅうり	べと病 うどんこ病 褐斑病 炭疽病 灰色かび病 菌核病 黒星病	1000倍	100～ 400L/10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内	10回以内 (土壌灌注は2回 以内、散布及びく ん煙及びエアゾル 剤の噴射は合計8 回以内)		
かぼちゃ	うどんこ病 べと病 疫病			収穫7日前 まで	3回以内			3回以内		
メロン	べと病 うどんこ病 つる枯病 菌核病			収穫3日前 まで	4回以内			5回以内		
すいか	炭疽病 つる枯病 うどんこ病 褐色腐敗病 菌核病			収穫前日 まで	4回以内			6回以内 (土壌灌注は2回 以内、散布及びく ん煙及びエアゾル 剤の噴射は合計4 回以内)		
トマト	疫病 葉かび病 炭疽病			収穫7日前 まで	2回以内			2回以内		
ミニトマト	灰色かび病 すすかび病 斑点病			収穫前日 まで	4回以内			4回以内		
なす	すすかび病 うどんこ病 褐色腐敗病 黒枯病 灰色かび病									

殺菌剤

名称: アミスターオプティフロアブル
 種類: アゾキシストロビン・TPN水和剤

適用の範囲と使用方法

2017年04月12日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
はくさい	べと病 白斑病 黒斑病 白さび病	1000倍	100～ 400L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	4回以内	3回以内 (は種又は定植前の 土壌混和は1回 以内、散布は2回 以内)
にんじん	黒葉枯病 斑点病 菌核病 しみ腐病 うどんこ病			収穫21日前まで	2回以内		3回以内 (粒剤は1回以 内、水和剤は 2回以内)	5回以内 (種子への吹き付 け処理は1回以 内)
たまねぎ	灰色かび病			収穫7日前まで	4回以内		4回以内	6回以内
ねぎ	べと病			収穫14日前まで	3回以内		5回以内 (粒剤は1回以 内、水和剤は 4回以内)	4回以内 (土壌灌注は1回 以内、散布は3回 以内)
	さび病							
	黒斑病 黄斑病 葉枯病 小菌核腐敗病							
にんにく	さび病 葉枯病			収穫7日前まで	3回以内		3回以内	6回以内
だいこん	白さび病			収穫45日前まで	3回以内		4回以内 (粒剤は1回以 内、水和剤は 3回以内)	3回以内
ピーマン	斑点病 うどんこ病 黒枯病 炭疽病 灰色かび病 疫病			収穫前日まで	4回以内 (粒剤は3回以 内)			
にがうり	うどんこ病			収穫7日前まで	3回以内		4回以内	