

殺虫剤

名称: チェス顆粒水和剤
種類: ピメトロジン水和剤

適用の範囲と使用方法

2014年12月17日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピメトロジンを含む農薬の総使用回数					
もも	アブラムシ類	5000倍	200~700L /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内					
なし				収穫21日前まで								
うめ			アブラムシ類	5000倍	200~700L /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内			
うり類 (漬物用)						収穫21日前まで						
みょうが(花穂)					アブラムシ類	5000倍	100~300L /10a	収穫前日まで	3回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	3回以内	
ズッキーニ								2回以内	3回以内	3回以内(定植時の株元散布は1回以内、散布は2回以内)		
ピーマン							3回以内	4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内)				
とうがらし類							4回以内		4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は4回以内)			
メロン								4回以内		4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は4回以内)		
すいか							4回以内		4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は4回以内)			
ばれいしょ	1000倍	25L/10a						収穫14日前まで		3回以内	散布	3回以内
オクラ	6000倍	100~300L /10a					収穫前日まで	3回以内	散布			
トマト	アブラムシ類											
ミニトマト	コナジラミ類											
	アブラムシ類											
きゅうり	コナジラミ類											
	アブラムシ類											
なす	アブラムシ類		5000倍	100~300L /10a	収穫前日まで	3回以内				散布	4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内)	
いちご	コナジラミ類										3回以内	
花き類・観葉植物					発生初期	4回以内					4回以内	