

殺菌剤

名称:チルト乳剤25
種類:プロピコナゾール乳剤

適用の範囲と使用方法

2020年8月12日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロピコナゾールを含む農薬の総使用回数	
とうもろこし	すす紋病	1000倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
飼料用 とうもろこし		8倍	800mL/10a			無人航空機による散布		
		16倍	1600mL/10a					
小麦	赤さび病	250~500倍	25L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	5回以内 (根雪前は2回以内、春期以降は3回以内)	
		1000~3000倍	60~150L/10a					
	うどんこ病	2000~3000倍		800mL/10a		収穫7日前まで		無人航空機による散布
	赤かび病	8倍	60~150L/10a					
		眼紋病 黒変病		1000~2000倍				
	黄斑病 葉枯症	1000倍	800mL/10a	根雪前		2回以内		散布
	なまぐさ黒穂病	750倍						
		8倍	800mL/10a	無人航空機による散布				
	紅色雪腐病	750~1000倍	60~150L/10a			2回以内		散布
	雪腐小粒菌核病	150倍	25L/10a					
		8倍	800mL/10a	無人航空機による散布				
大麦	網斑病 雲形病	1000倍	60~150L/10a	収穫21日前まで	1回	散布	1回	
	うどんこ病	2000~3000倍						
	赤かび病	1000~2000倍	800mL/10a			無人航空機による散布		
		8倍						

殺菌剤名称:チルト乳剤25
種類:プロピコナゾール乳剤

適用の範囲と使用方法

2020年8月12日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロピコナゾールを含む農薬の総使用回数
きく	白さび病	3000倍	100~300L /10a	発病初期	3回以内	散布	3回以内