

## 殺菌剤

名称:ユニフォーム粒剤  
種類:アゾキシストロビン・メタラキシルM粒剤

適用の範囲と使用方法

2019年2月13日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
みょうが (茎葉)	根茎腐敗病	18kg/10a	みょうが(花穂)の収穫30日前まで、但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで	2回以内	土壌表面散布	4回以内 (粒剤は2回以内、水和剤は2回以内)	2回以内
みょうが (花穂)			収穫30日前まで	3回以内	定植前作条土壌混和又は生育期土壌表面散布		
しょうが					いもち病	土壌表面散布	
葉しょうが	根茎腐敗病		収穫21日前まで				
こんにゃく	根腐病	9kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	2回以内 (植付時または培土時の処理は合計1回以内、培土後は1回以内)	2回以内 (植付時または培土時の処理は合計1回以内、培土後は1回以内)
			収穫30日前まで				
	白絹病		培土時				
ホップ	べと病	10~20g/株	株ごしらえ時~選芽期			1回	1回
ピーマン	疫病	3g/株	収穫前日まで	3回以内	株元散布	4回以内 (粒剤は3回以内)	4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
とうがらし類 (ししとうを除く)				1回		1回	1回
ししとう				3回以内		4回以内 (種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)	
パセリ		12kg/10a	収穫21日前まで	3回以内			4回以内 (粒剤は3回以内、水和剤は1回以内)

# 殺菌剤

名称:ユニフォーム粒剤  
種類:アゾキシストロピン・メタラキシルM粒剤

適用の範囲と使用方法

2019年2月13日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
オクラ	疫病	9kg/10a	収穫前日まで	3回以内	株元散布	6回以内 (全面土壌混和は1回以内、散布は2回以内、株元散布は3回以内)	5回以内 (種子への処理は1回以内、は種前の土壌混和は1回以内、は種後は3回以内)
	苗立枯病	9~18 kg/10a	は種前	1回			
にんじん	しみ腐病				9kg/10a	は種前又は定植前	1回
みずな	白さび病	9kg/10a	は種前	1回			
こまつな					は種前		
かぶ						定植前	
チンゲンサイ タアサイ	6~9kg/10a	6kg/10a	は種前	1回	作条土壌混和		4回以内 (粒剤は1回以内、水和剤は3回以内)
だいこん							
ほうれんそう	べと病	9kg/10a	は種前	1回	全面土壌混和	1回	2回以内 (種子への処理は1回以内、土壌混和は1回以内)
べにばないんげん	茎根腐病	1g/株	定植時	1回	株元散布	2回以内 (粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)	1回
たばこ	疫病	6~9kg/10a	大土寄期				
			6kg/10a	移植前	作条土壌混和		
しちとうい	べっこう病	3kg/10a	生育期	2回以内	湛水散布	2回以内	2回以内
くわい	茎腐病		収穫21日前まで				
せり	葉腐病			1回			

## 殺菌剤

名称:ユニフォーム粒剤  
種類:アゾキシストロビン・メタラキシルM粒剤

適用の範囲と使用方法

2019年2月13日現在

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	メタラキシル及びメタラキシルMを含む農薬の総使用回数
ねぎ	白絹病 べと病 さび病	9kg/10a	土寄せ時 但し、収穫90日 前まで	1回	株元土壌混和	5回以内 (粒剤は1回以 内、水和剤は4 回以内)	5回以内 (種子への処理は 1回以内、土壌混 和は1回以内、散 布は3回以内)
	ごぼう	黒あざ病	18kg/10a		は種前	作条土壌混和	1回
トルコギキョウ (水耕栽培)	根腐病	0.25g/株	定植時		株元散布	5回以内	4回以内 (但し生育期は3回 以内)
花き類・ 観葉植物	立枯病 (リゾクトニア菌)	18kg/10a	定植時 又は生育期	3回以内	土壌表面散布		
あじさい (ポット・プラン ター等の容器 栽培)	茎根腐病	土壌1L当り 0.25 g	鉢上げ時	1回	土壌混和		
たらのき	立枯疫病	20kg/10a	収穫終了後 (苗の場合は植 付後)～落葉前 但し、収穫60日 前まで	2回以内	土壌表面散布	2回以内	2回以内